

MORSO APERTO ANTERIORE E RESPIRAZIONE ORALE

Dr. Romano



UN PAZIENTE DI 8 ANNI SI È PRESENTATO IN CLINICA CON UNA MALOCCLUSIONE DI CLASSE II/1 CON MORSO APERTO, ARCATE STRETTE E SPINTA LINGUALE.

DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO PER LIBERARE LA LINGUA, GLI È STATO PRESCRITTO L'UTILIZZO DEL FROGGYMOUTH (15 MINUTI AL GIORNO) SENZA ALCUN ALTRO TRATTAMENTO ORTODONTICO.



IL PAZIENTE È STATO MOLTO COLLABORATIVO E HA INDOSSATO IL FROGGYMOUTH QUOTIDIANAMENTE.

DOPO 6 MESI, IL MORSO APERTO SI È CHIUSO SPONTANEAMENTE, LE ARCATE SI SONO ESPANSE E LA OVERJET (OJ) È STATA RIDOTTA.

IL MOVIMENTO DEI DENTI È AVVENUTO ESCLUSIVAMENTE GRAZIE AL CAMBIAMENTO MIOFUNZIONALE DEI MUSCOLI FACCIALI E DELLA LINGUA. A QUESTO PUNTO, È STATO AVVIATO IL TRATTAMENTO ORTODONTICO, MA IN UNA SITUAZIONE DECISAMENTE PIÙ FAVOREVOLE.



FROGGYMOUTH