



FROGGYMOUTH

DEGLUTIZIONE

QUANDO RICEVERETE LA CONFEZIONE DEL FROGGYMOUTH, ALL'INTERNO TROVERETE LE ISTRUZIONI CHE SPIEGANO COME UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, PER GUIDARVI NEL PROCESSO DI RIABILITAZIONE.

Questo modulo di monitoraggio aiuta anche a completare il protocollo, fornendo ulteriori domande da porre durante l'uso del dispositivo. Questo vi aiuterà a seguire i progressi del trattamento in modo più accurato ed efficiente.

VALUTAZIONE	TO (Inizio trattamento)	T1 (Dopo 3 mesi)	T2 (Dopo 6 mesi)
Si osservano contrazioni della muscolatura labiomentale?			
<ul style="list-style-type: none"> Quando si chiede al paziente di deglutire? Quando si osserva una deglutizione inconsapevole (durante una discussione di circostanza o quando si propone al paziente un'attività che cattura la sua attenzione)? 			
Le arcate sono in occlusione durante la deglutizione?			
Il paziente tende a cercare il contatto tra la mucosa labiale e la lingua? Il paziente passa la lingua sulle labbra?			
Il paziente ha le labbra screpolate? Presenta irritazioni intorno alle labbra?			

ESAME DENTALE E DELLA MASTICAZIONE

VALUTAZIONE	TO (Inizio trattamento)	T1 (Dopo 3 mesi)	T2 (Dopo 6 mesi)
Il paziente presenta una masticazione unilaterale alternata?			
Il paziente presenta una deformità dentale o scheletrica (morso aperto anteriore, morso aperto posteriore, morso incrociato, morso inverso, DDM ecc.) Se sì, questa deformazione è lieve / moderata / significativa?	<ul style="list-style-type: none"> nessuna lieve moderata significativa 	<ul style="list-style-type: none"> nessuna lieve moderata significativa 	<ul style="list-style-type: none"> nessuna lieve moderata significativa

ARTICOLAZIONE E LINGUAGGIO

VALUTAZIONE	TO (Inizio trattamento)	T1 (Dopo 3 mesi)	T2 (Dopo 6 mesi)
Notate una postura bassa della lingua a riposo?			
Si osserva un'interposizione linguale quando il paziente parla?			

FROGGYMOUTH



RESPIRAZIONE

VALUTAZIONE	T0 (Inizio trattamento)	T1 (Dopo 3 mesi)	T2 (Dopo 6 mesi)
Il paziente ha spesso la bocca aperta o socchiusa durante il giorno?			
La respirazione è rumorosa di notte?			
Il paziente russa durante la notte?			
Il paziente si sveglia con la bocca asciutta?			
Il paziente sbava di notte? (macchia umida sul cuscino)			
Il paziente presenta occhiaie e un colorito pallido?			
Il paziente suda durante la notte?			

MODULO DI MONITORAGGIO PER IL TRATTAMENTO CON FROGGYMOUTH

Questo modulo di monitoraggio per il trattamento con il dispositivo di riabilitazione funzionale **FROGGYMOUTH** vi aiuterà a tenere traccia dei vostri progressi. Si consiglia di effettuare una valutazione al momento del primo trattamento con il dispositivo **FROGGYMOUTH** e di ripeterla dopo 3 mesi e 6 mesi per valutare meglio i progressi della terapia. Per garantire una valutazione accurata, è importante compilare questo modulo di monitoraggio con il paziente e/o i suoi genitori. Insieme, sarete in grado di tracciare i progressi del trattamento con il dispositivo **FROGGYMOUTH** e di avvicinarvi ai vostri obiettivi di riabilitazione!

COMPORAMENTO

VALUTAZIONE	T0 (Inizio trattamento)	T1 (Dopo 3 mesi)	T2 (Dopo 6 mesi)
Quando il paziente si sveglia, è spesso stanco o, al contrario, è iperattivo?			
(per un bambino di meno di 10 anni) Il paziente continua a bagnare il letto di notte?			
Il paziente fatica ancora a prestare attenzione a scuola?			
Il paziente ha difficoltà a regolare le proprie emozioni?			
Il paziente presenta malattie o infezioni frequenti (ad esempio, infezioni alle orecchie)?			



ESAME DEL PAZIENTE CHE INDOSSA IL FROGGMOUTH

VALUTAZIONE	1° APPUNTAMENTO	2° APPUNTAMENTO (PER 10 E 20 GIORNI DALL'INIZIO DEL TRATTAMENTO)	3° APPUNTAMENTO (O APPUNTAMENTO FINALE)
Il paziente usa il dispositivo tutti i giorni?			
Il paziente succhia rumorosamente la saliva?	☹		
Il paziente posiziona l'apice linguale nell'apertura del dispositivo?			
Il paziente usa il dispositivo tutti i giorni?			
Come respira il paziente? Buccale, mista con tendenza buccale, mista con tendenza nasale o nasale.	☹☹	☹☹☹	
Durante l'esercizio vocale, vedete la lingua che cerca di superare la barriera dei denti? Oppure rimane al suo posto per poter svolgere la sua funzione di deglutizione?			☹☹☹☹



Questo è del tutto normale durante la prima settimana: perseverate e avrete successo!

Azione: se il paziente continua a sbavare, a inspirare rumorosamente o se dopo 14 giorni continua a posizionare l'apice linguale nello spazio di Froggmouth, raccomandate l'esercizio di "lotta".



Suggerimento: è possibile utilizzare un piccolo specchio per osservare l'apertura delle narici e la direzione del flusso d'aria.



Punto d'azione: se la respirazione non è ancora nasale dopo 3 mesi (T1), praticate l'esercizio del "profumo" per renderlo automatico!



Punto d'azione: ripetere l'esercizio del "linguaggio" per valutare se il trattamento deve continuare o se il paziente è pronto a passare alla fase finale.

